

## ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» информирует!

### В выходные и праздничные дни по вопросам передачи клеща для лабораторного исследования обращаться по телефону горячей линии +7(961)-013-39-60

С наступлением весны участились случаи обращения граждан в медицинские учреждения в связи с присасыванием клещей. Эти кровососущие членистоногие широко распространены на территории нашей области. Клещи являются переносчиками возбудителей таких инфекций как, Боррелиоз или Болезнь Лайма, Моноцитарного Эрихиоза Человека, Гранулоцитарного Анаплазмоза Человека и Клещевого Вирусного Энцефалита. Смоленская область является не эндемичной территорией по КВЭ, но другие бактериальные формы инфекции, как ГАЧ, МЕЧ и Боррелиоз ежегодно выявляются путем исследования клеща методом ПЦР – диагностики.

Период активности клещей (апрель – июнь, август – сентябрь), не все клещи являются переносчиками возбудителя, но при посещении леса и других открытых ландшафтных зон, необходимо соблюдать меры безопасности и одеваться таким образом, чтобы клещ не мог проникнуть под одежду к телу, брюки заправить в носки или сапоги. Обшлага рукавов должны быть на плотном манжете. Волосы подобрать под шапку или косынку, плотно прилегающую к голове. Находясь в лесу, проводить само- и взаимоосмотры каждые 15 минут, а также тщательный осмотр тела и одежды после возвращения из леса, парка, сквера. Верхняя одежда должна быть обработанной репеллентными и акарицидными препаратами (аэрозоли) с соблюдением мер предосторожности и согласно инструкции по применению.

В случае присасывания клеща обратиться за медицинской помощью в лечебно – профилактическое учреждение. До обращения к врачу можно (если имеется опыт подобных манипуляций) самостоятельно снять клеща пинцетом или ниткой, завязанной у хоботка, а место извлечения клеща смазать йодом или спиртом.

**ВАЖНО!** Раздавливать снятого клеща руками опасно, так как возбудитель может попасть через микротрещины на руках в организм человека.

**МИФ! Прижигать, смазывать присосавшегося клеща маслом, спиртом, керосином так же не допускается, масло убивает клеща закупорив дыхательные отверстия, и удалять его все равно придется, умерев членистоногое может срыгнуть содержимое в ранку, тем самым увеличивая риск заражения.**

После консультации врача-инфекциониста, может возникнуть необходимость исследовать клеща на наличие возбудителя КВЭ, ГАЧ, МЕЧ и Клещевого Боррелиоза. Это можно сделать в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (г.Смоленск, Тульский пер., д.12).

Транспортировать клеща необходимо в ёмкости (баночка, пузырёк, пробирка и т.д.) с плотно притёртой крышкой. Перед доставкой клеща на исследование необходимо получить соответствующую консультацию по телефону: 61-82-07.

Энтомолог/Зоолог  
Воробьева М.В.