



Энтеровирусные инфекции у детей

Основные пути заражения

Контактно-бытовой

Водный

Пищевой

Симптомы заболевания

Инкубационный период от 2 до 7 дней

Подъем температуры до 39-40 гр.
Слабость
Головная боль
Рвота
Боли в животе
Диарея (понос)



Меры профилактики:

Соблюдение питьевого режима


Фрукты, овощи, ягоды тщательно мыть под проточной водой небольшими порциями.

Личная гигиена

Влажная уборка помещений

Правильное хранение скоропортящихся продуктов, при наличии холода

РОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ !!! При первых признаках энтеровирусной инфекции у ребенка, его ни в коем случае нельзя допускать к посещению организованных коллективов (школ, детских дошкольных учреждений, летних лагерей и площадок).



Энтеровирусная инфекция (ЭВИ) – это группа инфекционных заболеваний человека, вызываемых энтеровирусами, с преимущественно фекально-оральным механизмом передачи возбудителей, которая характеризуется многообразием клинических проявлений от геморрагического конъюнктивита до вирусного менингита.

ЭВИ устойчивы во внешней среде и дезинфицирующим средствам. Энтеровирусы длительное время могут сохраняться в сточных водах, так же могут находиться в плавательных бассейнах, в открытых водоемах, на предметах обихода, в продуктах питания (овощи, фрукты, молоко, мясо)